



Lungcancer

Palliativ vård

260921

Lina Lindberg

Lungläkare



Nationellt vårdprogram lungcancer

Tidig inskrivning i ett palliativt team är att föredra vid behandling av avancerad sjukdom för att möjliggöra en specialiserad multidisciplinär symtomlindrande behandling och omhändertagande. För patienter med lungcancer har man även visat att tidig inskrivning i palliativt team leder till förbättrad livskvalitet och förbättrad överlevnad.

Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Gallagher ER, Admane S, Jackson VA, et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2010;363(8):733-42.

Onkologisk behandling vid lungcancer

- Cytostatika
- Immunterapi
- Målriktad behandling

- Kombinationer
- Indikation PS 0-2 (3)

Vanliga symtom vid lungcancer

- Dyspné
- Hosta
- Hemoptys
- Heshet
- Vena cava superior-syndrom
- Hjärnmetastaser
- Smärta

Dyspné

- FT/AT
- Morfin, bensodiazepiner
- RT och/eller onkologisk behandling vid obstruerande tumör
- (Syrgas – enbart vid hypoxi)
- Pleuravätska

Pleuravätska

- Onkologisk behandling
- Pleurocentes
- Pleurodes
- Kvardrän PleurX

Hosta

- Palliativ strålbehandling vid tumörobstruktion
- Bronkvidgande läkemedel vid produktiv hosta
- Po opioider vid rethosta
- Midazolam, robinul

Hemoptys

- Tranexamsyra
- Morfin
- RT
- (Coiling)

Stämbandspares

- Svag läckande röst
- Försämrade hoststöt
- Försämrade sväljningsfunktion
- Logoped
- Medialisering av stämband

Vena cava superior-syndrom

- Betapred 8 mg x 2
- Stent
- Cytostatika (SCLC)
- RT

Hjärnmetastaser

- Betapred vid symtomgivande ödem
- Cytostatika
- RT (SBRT eller helhjärna)
- (Operation)

Skelettmetastaser

- Fysioterapeut – anpassad fysisk aktivitet
- Läkemedelsbehandling
- Frakturrisk: Profylaktisk operation + RT
- Neurologi: steroider, ryggortoped NUS!
- Smärtpalliativ RT
- Zoledronsyra/denosumab (tandläkarbedömning)

