



## Nyhetsbrev ALK Hudsjukdomar juni 2023

Kära kollegor!

### **Sommaren stundar och vi funderar alla över vad vi ska göra med våra patienter som har aktinisk keratos / superficiella basaliom nu då Aldara (Imikvimod) är restnoterat!**

Alternativet till Imikvimod för behandling av Aktinisk keratos är just nu Actikerall (Fluorouracil,+ salicylsyra) och Zyclara 3,75%, dessa läkemedel ska apoteken kunna beställa hem. Preliminärt datum då Aldara kommer vara tillgängligt för expedition på apotek igen är 21/7.

För superficiella basaliom kan excision kan vara ett alternativ i väntan på att Aldara återigen finns på apoteken. Utförandet av excision av superficiellt basaliom gör vi själva på egen klinik/hälsocentral.

### **Användning av Actikerall för aktinisk keratos**

Dosering enligt FASS:

Appliceras 1 gång dagligen på aktuellt hudområde till dess att lesionen är borta men under maximalt 12 veckor. Max yta för applicering 5x5 cm(25cm<sup>2</sup>). Dosen behöver inte justeras för äldre.

Effekt ses tidigast efter 4 veckors behandling och effekten ökar över tid. Behandling bör fortsätta även om man inte ser effekt efter 4 veckor.

För mer utförlig information och behandlingsrekommendationer rekommenderar jag att man går in på *Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd* och väljer ämnesområdet [Hud och Kön](#). Här kan man klicka vidare på [Aktinisk keratos](#) (uppdaterad med lokalt tillägg Norrbotten) samt [Basaliom](#) (även här uppdaterat lokalt tillägg Norrbotten).

Hudkliniken hälsar att även att det kan vara okej att vänta 4-5 veckor på att påbörja behandling för aktinisk keratos och superficiella basaliom, många patienter väntar med sin behandling om de t ex skall resa bort under sin semester eller skall opereras och då inte får sår på huden.

Önskar er alla en trevlig sommar!

Med vänliga hälsningar,

Evelina Lilja  
ALK Hudsjukdomar  
ST-läkare vårdcentralen Norra hamn