

Val av skyddsutrustning vid luftvägsmitta (om patient bedöms smittsam)

Se sista kolumnen för tuberkulos (TBC), mässling, vattkoppor

Skyddsutrustning Val efter riskbedömning	VÅRDSITUATION / OMVÅRDNAD					
	Avstånd mer än 2 meter	Ingen risk för kontakt med kroppsvätskor men kontakt med patient / patientens säng och närliggande utrustning	Risk för kontakt med kroppsvätskor samt vid stickande och skärande moment	Vid risk för mycket spill / stänk av kroppsvätskor	Vid vårdmoment med förhöjd risk för smitta (tidigare aerosol-genererande procedurer)	Vid TBC, Mässling & vattkoppor
	Till exempel: • Samtal	Till exempel: • Av- och påklädning • Bädda säng • Kontrollera blodtryck och puls	Till exempel: • Blodprov • Bädda säng • Personlig hygien • Provtagning övre luftvägar • Sårömläggning	Till exempel: • Diarré • Kräkningar	Till exempel: • BiPAP, CPAP • HLR • Sugning av luftvägar utan slutet sugsystem • Trakeostomivård	
Basala hygienrutiner	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Plastförkläde utan ärm	NEJ	JA	JA	NEJ	JA	JA
Plastförkläde med lång ärm	NEJ	NEJ	NEJ	JA	NEJ	NEJ
Stänkskydd: visir /skyddsglasögon	NEJ	JA	JA	JA	JA	JA
Stänkskydd: munskydd klass IIR, klass II	NEJ	JA	JA	JA	NEJ	NEJ
Andningsskydd FFP3	NEJ	NEJ/ JA*	NEJ / JA *	NEJ / JA *	JA	JA
Skyddshandskar	NEJ	NEJ	JA	JA	JA**	JA**

* **Inom 2 m** vid misstänkt/konstaterad smittsam covid 19, influensa om kontakt en längre tid, riktmärke kontakt med patienten mer än 1 timme per arbetspass

**Vid risk för kontakt med kroppsvätskor (omfattar även luftvägssekret) använd skyddshandskar.

